

Master Imagina

Transformations, visualisation

G. Gesquière

Gilles.Gesquiere@liris.cnrs.fr



UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2
UNIVERSITÉ DE LYON

Extraits du cours de Romain Raffin; romain.raffin@univ-provence.fr

Plan

- quelques rappels de maths ;
- transformations de l'espace ;
- projections ;
- visualisation ;

I. Quelques rappels de maths / Vecteur


1) Vecteur

- coordonnées (x, y, \dots) telles que

$$\begin{aligned}x &= B.x - A.x \\ y &= B.y - A.y \\ \dots\end{aligned}$$

- opérations :

- addition ;
- soustraction ;
- multiplication par un scalaire.



I. Quelques rappels de maths / Vecteur

Définition de la norme d'un vecteur

Dans un repère orthonormé, la norme d'un vecteur est :

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + \dots}$$

Propriétés de la norme d'un vecteur

- la norme d'un vecteur \vec{AB} est la **distance** de A à B
- un vecteur de norme 1 est dit **normé**.
- pour tout vecteur \vec{u} non nul, il existe un vecteur normé de même direction :

$$\vec{u}_{normé} = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$$

I. Quelques rappels de maths / Vecteur

Définition du produit scalaire de deux vecteurs

Dans un repère orthonormé, le produit scalaire associe deux vecteurs à un nombre réel :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x \times v_x + u_y \times v_y + \dots$$


Propriétés du produit scalaire de deux vecteurs

- symétrie : $\vec{u} \cdot \vec{u}^T = \vec{u}^T \cdot \vec{u}$
- distributivité : $(\vec{u}_1 + \vec{u}_2) \cdot \vec{u}_3 = \vec{u}_1 \cdot \vec{u}_3 + \vec{u}_2 \cdot \vec{u}_3$
- homogénéité : $(\alpha \vec{u}) \cdot \vec{u}^T = \alpha (\vec{u} \cdot \vec{u}^T)$
- lien avec la norme : $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$

I. Quelques rappels de maths / Vecteur

Application du produit scalaire dans le plan


$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v})$$



-> calcul de l'angle entre 2 vecteurs

I. Quelques rappels de maths / Vecteur

Signe du produit scalaire




I. Quelques rappels de maths / Vecteur

Définition du produit vectoriel de deux vecteurs

Dans un repère orthonormé, le produit vectoriel associe deux vecteurs à un vecteur résultat :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{bmatrix} u_y \times v_z - u_z \times v_y \\ u_z \times v_x - u_x \times v_z \\ u_x \times v_y - u_y \times v_x \end{bmatrix}$$

-> le vecteur résultat est **orthogonal** aux deux premiers (utile pour les repères, les normales, ...)



I. Quelques rappels de maths / Matrices

2) Matrices

$$\begin{bmatrix} a_0 & a_1 & a_2 \\ b_0 & b_1 & b_2 \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} = \text{collection de vecteurs}$$

Opérations :

- Addition : $\begin{bmatrix} a_0 & a_1 \\ b_0 & b_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_0 & t_1 \\ u_0 & u_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0+t_0 & a_1+t_1 \\ b_0+u_0 & b_1+u_1 \end{bmatrix}$
- multiplication par un scalaire : $n \times \begin{bmatrix} a_0 & a_1 \\ b_0 & b_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n \times a_0 & n \times a_1 \\ n \times b_0 & n \times b_1 \end{bmatrix}$
- multiplication par une matrice : $\begin{bmatrix} a_0 & a_1 \\ b_0 & b_1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} t_0 & t_1 \\ u_0 & u_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (a_0 \times t_0 + a_1 \times u_0) & (a_0 \times t_1 + a_1 \times u_1) \\ (b_0 \times t_0 + b_1 \times u_0) & (b_0 \times t_1 + b_1 \times u_1) \end{bmatrix}$

I. Quelques rappels de maths / Matrices

Opérations supplémentaires sur les matrices

- déterminant, co-facteurs ;
- inversion (délicat), peut ne pas être possible (revient au problème de recherche de solutions d'équations) ;
- transposée

Autres besoins :

- équations paramétriques de droites et courbes ;
- équations implicites de plans ;
- changements de repères.

Rappel du plan

- quelques rappels de maths ;
- transformations de l'espace ;
- projections ;
- Visualisation ;
- parties cachées.

II. Transformations de l'espace


- survol en 2D ;
- coordonnées homogènes ;
 - translation ;
 - mise à l'échelle (scaling) ;
 - rotation ;
 - réflexions ;
- compositions de transformations.

II. Transformations / Survol en 2D

1) Survol en 2D

Translation de vecteur \vec{v} du point P : $P' = P + \vec{v}$


$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \end{bmatrix}$$



II. Transformations / Survol en 2D

Rotation de centre O et d'angle t : $P' = R_t \cdot P$


$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$



II. Transformations / Survol en 2D

Homothétie de centre O et de rapport k : $P' = k \cdot P$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$



II. Transformations / Survol en 2D

Les mêmes relations peuvent être écrites en 3D. Il se pose alors 3 problèmes :

- opérations différentes pour les translations (addition de matrices) ;
- pb de commutativité ;
- pb de la rotation 3D (définition de centre, continuité).

II. Transformations de l'espace

- **survol en 2D** ;
- **coordonnées homogènes** ;
 - translation ;
 - mise à l'échelle (scaling) ;
 - rotation ;
 - réflexions ;
- **compositions de transformations.**

II. Transformations / Coordonnées homogènes


Pour résoudre le problème d'écriture des opérations : on passe en **coordonnées homogènes**.

-> on ajoute une coordonnée, w

Les coordonnées homogènes permettent de représenter toutes les transformations affines comme des produits de matrice.

Valeurs de w :

- 1 pour les points ;
- 0 pour les vecteurs.



II. Transformations / Coordonnées homogènes

Passage en coordonnées homogènes $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x_h \\ y_h \\ z_h \\ w_h \end{pmatrix}$ avec $x = x_h/w_h$
 $y = y_h/w_h$
 $z = z_h/w_h$


Translation $P' = P + \vec{T} \rightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ w' \end{pmatrix}_{P'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & T_x \\ 0 & 1 & 0 & T_y \\ 0 & 0 & 1 & T_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix}_P$

Mise à l'échelle $P' = S \cdot P \rightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ w' \end{pmatrix}_{P'} = \begin{pmatrix} S_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & S_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix}_P$

Réflexion $P' = M \cdot P \rightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ w' \end{pmatrix}_{P'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix}_P$ (par rapport à y)

II. Transformations / Coordonnées homogènes

Rotation 3D en coordonnées homogènes



Rotation autour d'un axe (x, y, z) d'angle α :


$$R = \begin{pmatrix} t^2x^2 + c & txy + sz & txz - sy & 0 \\ txy - sz & ty^2 + c & tyz + sx & 0 \\ txz + sy & tyz - sx & tz^2 + c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ avec } \begin{cases} s = \sin \alpha \\ c = \cos \alpha \\ t = 1 - \cos \alpha \end{cases}$$

Rotation autour de (Ox)	Rotation autour de (Oy)	Rotation autour de (Oz)
$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \cos \alpha & 0 & \sin \alpha & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \alpha & 0 & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

II. Transformations / Compositions

Pb de commutativité des transformations ? l'ordre est-il important ?


Rotation puis scaling
 Scaling puis rotation



II. Transformations / Compositions

Pb de commutativité ?

Rotation puis translation
 Translation puis rotation




II. Transformations de l'espace

- survel-en-2D;
- coordonnées homogènes;
 - translation;
 - mise à l'échelle (scaling);
 - rotation;
 - réflexions;
- compositions de transformations.

II. Transformations / Compositions


Exemples d'utilisation (1) : principe de modélisation



II. Transformations / Compositions

Exemples d'utilisation (2) : principe de visualisation

- arbre graphique ou graphe de scène
- CSG (Constructive Solid Geometry)



II. Transformations de l'espace


- **survol en 2D** ;
- **coordonnées homogènes** ;
 - translation ;
 - mise à l'échelle (scaling) ;
 - rotation ;
 - réflexions ;
- **compositions de transformations**.

Plan

- quelques rappels de maths ;
- transformations de l'espace ;
- projections ;
- visualisation ;
- parties cachées.


III. Projections

Rappel




1) projections **parallèles** :

- orthographique
- oblique



2) projections **perspectives** :

- selon un axe principal
- générale



III. Projections / parallèle

1) Projection parallèle

Il existe deux types de projections parallèles


- projection orthographique lorsque la direction de projection est perpendiculaire au plan de projection ;
- projection oblique sinon.

Propriétés géométriques des projections parallèles

- conservent le **parallélisme** des droites ;
- conservent **les rapports des distances** selon une direction donnée.

III. Projections / parallèle


a) orthographique



- éliminer Z -- vue de dessus
- éliminer Y -- vue de côté
- éliminer X -- vue de face


$$M_{\text{orth},z} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_{\text{orth},x} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



III. Projections / parallèle

b) oblique




$$M_{\text{axo}} = M_{\text{orth},x} \cdot R_z \cdot R_y \cdot R_x \cdot T$$

III. Projections / parallèle

volume de vue en projection parallèle

Pour se ramener à un volume de vue canonique, on effectue une rotation du repère.




III. Projections / perspective

2) projection perspective



Définitions :

- l'image d'un point M par une projection en perspective sur le plan P de centre O est l'**intersection** de la droite (OM) avec le plan P ;
- une projection en perspective dont le centre de projection est à l'**infini** est une projection parallèle.



III. Projections / perspective

Analogie avec une caméra




III. Projections / perspective

Propriétés géométriques des projections en perspective


- les projections **ne conservent pas** le parallélisme des droites non parallèles au plan de projection ;
- la taille d'un objet est **inversement proportionnelle** à sa distance au point de projection :

$$\| \text{Proj}(M) \text{Proj}(M') \| = \| \overrightarrow{MM'} \| \times \frac{d_0}{d}$$



III. Projections / perspective

Coordonnées du point projeté en fonction de celles du point source, projection du point M sur le plan *near* :



III. Projections / perspective


Matrice en coordonnées homogènes de la projection

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ w' \end{pmatrix}_{P'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{near} & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix}_T$$

III. Projections / perspective

Volume de vue en projection perspective

Pour se ramener à un volume de vue canonique, on effectue une rotation et une translation du repère.



III. Projections / perspective

Calcul de la pseudo-profondeur dans une projection en perspective

- On conserve une valeur de la profondeur telle que deux points ayant la même projection soient distinguables.
- On utilise une fonction homogène avec celle de x et y :

$$M'_z = (a \cdot M_z + b) / (-M_z)$$

- et on choisit $M'_z = -1$ pour $M_z = -near$ et $M'_z = 1$ pour $M_z = -far$

(On rend les faces avant et arrière du volume de vue coplanaires avec les faces du volume de vue canonique.)

- donc $a = \frac{-far + near}{far - near}$ et $b = -2 \frac{far \times near}{far - near}$


III. Projections / perspective

Points de fuite

- si une droite D coupe le plan de projection, il existe un point F , appelé **point de fuite** appartenant à la projection de toute droite parallèle à D (cf. diapo précédente) ;
- on différencie les projections en perspective par le nombre de points de fuite pour les directions des axes du repère (le nombre d'intersections des axes de coordonnées avec le plan) ;
- en général on a deux points de fuite (caméra verticale non parallèle à un des axes) ;
- le troisième point de fuite n'augmente pas significativement le réalisme.


III. Projections / perspective

Exemple (1) : 2 points de fuite



III. Projections / perspective

Exemple (2) : 3 points de fuite




Plan

- quelques rappels de maths ;
- transformations de l'espace ;
- projections ;
- visualisation ;
- parties cachées.

IV. Visualisation

si on reprend l'analogie de la caméra virtuelle :



IV. Visualisation / Découpage et fenêtrage



Que faut-il faire ?

- le **découpage** de la vue suivant les plans avant et arrière du volume de vision
- le **fenêtrage** à l'affichage

Quelques outils :

- intériorité d'un point pour un polygone
- appartenance d'un point à un segment
- intersection de segments
- inclusion d'un polygone dans un autre

